

**БЕКИТЕМ**

Кыргыз Республикасынын  
Саламаттык сактоо министрлигинин  
Дары-дармектер жана медициналык  
техникалар менен камсыздандыруу  
департаментинин башкы директору  
Курманов Р.А.

«24» июль 20 15 ж.



**Дарыны медицинада колдонуу боюнча  
НУСКАМА  
(адистер үчүн маалымат)**

**ДИСТРЕПТАЗА**

**Каттоо номери** \_\_\_\_\_

**Соодадагы атальшы** ДИСТРЕПТАЗА®  
DISTREPTAZA®

**Эл аралык патенттөлбөген атальшы**  
Жок

**Дарынын түрү**  
Ректалдык суппозиторийлер.

**Курамы**

1 суппозиторий өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт

Активдүү заттар: стрептокиназа 13 500 – 16 500 ЭБ, стрептодорназа 1250 – 20000 ЭБ

Көмөкчү заттар: витенсол Н15, парафин майы.

**Сүрөттөмөсү**

Ачык сары кызгылт-ак түстөгү суппозиторийлер, бети бир тектүү так жана бүртүкчөлөрү, боштуктары, жаракалары, механикалык жабыркоолору жок, аягы учтуу келген конус же цилиндр көлөмүндө.

**Фармадарылык тобу**

Башка гематологиялык дарылар. Ферменттик дарылар.  
АТС коду B06AA55

**Фармакологиялык касиеттер**

Дары эки активдүү субстанцияны камтыйт: стрептокиназаны жана стрептодорназаны.

Стрептокиназа адамдын канында камтылган плазминоген проэнзимдин активдештируучусу болуп саналат, жана стрептокиназанын таасири алдында адамдын уюган канын эрите турган касиетке ээ болгон плазминге айланат. Стрептодорназа нуклеопротеиддердин илээшме массасын, өлгөн клеткаларды же ириңди эрите турган жөндөмдүүлүккө ээ болгон энзим болуп саналат, бул учурда тирүү клеткаларга жана алардын физиологиялык функциясына таасирин тийгизбейт. Дары сезгенүү чордонуна антибиотиктердин же химиялык дарылоочу каражаттардын жетүүсүн жөнилдетет.

### **Колдонууга көрсөтмөлөр**

- өнөкөт сальпингофорит
- операциядан кийинки кичине жамбаш чарасынын органдарынын инфильтративдүү жабыркоолору
- эндометрит
- курч жана өнөкөт геморрой
- периректалдык абсцесс жана кеңири сезгенүү инфильтраты бар кулгuna
- ириңдеген каудалдык кисталар

### **Колдонуу жолу жана дозасы**

Суппозиторииди алуу жана көтөн чучукка терең киргизүү керек.

Дозалоо - сезгенүү процессинин интенсивдүүлүк даражасынан жана түрүнөн көз каранды.

*Чоңдордо оорунун оор жүрүшүндө:*

Алгачкы 3 күндүн ичинде 1 суппозиториийден күнүнө 3 жолу;

Кийинки 3 күндүн ичинде 1 суппозиториийден күнүнө 2 жолу;

Кийинки 3 күндүн ичинде 1 суппозиториийден күнүнө 1 жолу;

*Чоңдордо оорунун жесөнлөк жасана орто оордук даражасында:*

3 күндүн ичинде 1 суппозиториийден күнүнө 2 жолу;

Кийинки 4 күндүн ичинде 1 суппозиториийден күнүнө 1 жолу;

Же 2 күндүн ичинде 1 суппозиториийден күнүнө 2 жолу.

Дарылоо курсуна орточо эсеп менен 8 – 18 суппозиторий колдонулат.

Дарылоо курсунун орточо узактыгы 7 – 10 күн.

### **Кыйыр таасирлери**

*Кээде*

- аллегиялык реакциялар
- дene табынын жогорулоосу
- кан агууларга жакын болуу

*Кандайдыр бир башка реакциялар пайды болсо, сөзсүз дарыгер менен дарыны колдонууну улантуу мүмкүнчүлүгү тууралуу кеңешшиңиз!*

### **Каршы көрсөтмөлөр**

- дарынын бардык курам бөлүгүнө болгон жогорку сезимталдуулук
- кичине жамбаш чарасынын органдарына жана көтөн чучукка жасалган операциядан кийинки эрте мезгил
- геморрагиялык диатез

- кош бойлуулук

### **Дарылардын өз ара таасирлери**

Дары сезгенүү чордонуна антибиотиктердин же химиялык дарылоочу каражаттардын синүүсүн жөңилдетет.

Антикоагулянттар менен коштоп колдонууга болбайт, себеби жергиликтүү кан агуулар пайда болушу мүмкүн.

Эгер Сиз башка дары каражаттарын кабыл алыш жатсаныз, сөзсүз дарыгериңизге маалымдаңыз!

### **Өзгөчө көрсөтмөлөр**

Дары жаңы жаракат же тигилген жерге тийбеши керек, себеби бул нерсе тигилген жердин бошошуна, жана натыйжа катары жаракаттан кан агууга алыш келиши мүмкүн.

Дистрептаза дарысы менен дарылоо учурунда, алдын ала дарыгер менен кеңешпей туруп башка дары каражаттарды (ошондой эле рецепти жок чыгарылган дарыларды) кабыл албаңыз . Көзөмөлү жок дарылоо Сиздин ден соолугунузга зыян келтириши мүмкүн.

### *Педиатрияда колдонуу*

Балдарга колдонуу тажрыйбасы жок, себеби клиникалык изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес, ошондуктан 18 жашка чейинки балдарга жана өспүрүмдөргө колдонууга сунушталбайт.

### *Кош бойлуулук жсана эмизүү мезгили*

Кош бойлуу жана эмизип жаткан айымдарга колдонуу тажрыйбасы жок, себеби клиникалык изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес, ошондуктан кош бойлуу жана эмизип жаткан айымдарга дарыны колдонууга сунушталбайт.

*Дары каражасынын унаа каражасын жсана потенциалдык кооптуу механизмдерди башкаруу жсөндөмдүүлүгүнө тийгизген таасири  
Таасирин тийгизбейт.*

### **Ашыкча доза**

Табылган жок

### **Чыгаруу формасы жана таңгакчасы**

6 же 5 суппозиторий контурлуу уячалуу поливинилхlorид жана полиэтилен таңгакчага салынат, сыйымдуулугу 2,1 мл

1 (№6 таңгактоосу үчүн) же 2 (№10 таңгактоосу үчүн) контурлуу уячалуу таңгакча мамлекеттик жана орус тилиндеги колдонуу боюнча нускамасы менен биргө картон кутучасына салынган.

### **Сактоо шарты**

2° С дан 8° С га чейинки аба табында сактоо керек (муздаткычта)

Тондуруууга болбайт!

Балдар жетпеген жерде сактоо керек!

**Сактоо мөөнөтү**

3 жыл

Таңгакчасында көрсөтүлгөн жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

**Дарыканалардан чыгаруу шарты**

Рецепт боюнча

**Өндүрүүчү**

«БИОМЕД-ЛЮБЛИН» Вытвурня Суровиц жана Щепенэк Спулка Акцыйна

Университетская көч. 10, 20-029 Люблин, Польша

Эксклюзивдүү өкүлү:

Альпен Фарма АГ Берн, Швейцария