

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Курманов Р.А.

«02» _____ 20/16 г

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ИНФЛЮЦИД (INFLUCID®)

Регистрационный номер _____

Торговое наименование: Инфлюцид

Международное непатентованное название: нет

Лекарственная форма Таблетки

Состав лекарственного средства

В 1 таблетке (250 мг) содержится:

активные вещества: Aconitum (аконит аптечный) D3 25 мг, Bryonia (переступень двудомный) D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum (посконник пронзеннолистный) D1 25 мг, Gelsemium (гельземий вечнозеленый) D3 25 мг, Ipecacuanha (ипекакуана) D3 25 мг, Phosphorus (фосфор) D5 25 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, пшеничный крахмал.

Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Код АТС: R05X

Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия явно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных субстанций. Гомеопатические средства стимулируют защитные силы самого организма и активируют таким образом его потенциал самоизлечения. Ответ организма на гомеопатическое средство строго индивидуален. По этой причине дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

Показания

Лечение и профилактика лихорадочных гриппоподобных инфекций и других острых вирусных инфекций верхних дыхательных путей. Поддерживающее лечение гриппа.

Способ применения и дозировка

Способ применения

Таблетки следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта. Маленьким детям можно измельчить таблетки и растворить их в небольшом количестве воды.

Взрослые: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждый час, но не более 12 таблеток в день, до облегчения симптомов. Для *последующего лечения* принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Для *профилактики* инфекций принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Педиатрическая группа

Дети от 1 до 11 лет: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждые 2 часа, но не более 8 таблеток в день, до улучшения симптомов. При *последующем лечении* принимают по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети с 12 лет и старше: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждый час, но не более 12 таблеток в день, до облегчения симптомов. Для *последующего лечения* принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Для *профилактики* инфекций дети до 12 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в день, а дети с 12 лет и старше принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Побочные действия

Очень редкие (<1/10,000) или неизвестные (частота не может быть оценена на основе имеющихся данных):

Реакции гиперчувствительности, например сыпь на коже и желудочно-кишечные расстройства. В этих случаях, прием Инфлюцида следует прекратить и обратиться к врачу.

Примечание: при применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Препарат нельзя принимать при известной гиперчувствительности к *Eupatorium perfoliatum* (посконнику пронзеннолистному) либо другим членам семейства сложноцветных, другим активным или вспомогательным веществам.

Передозировка

Не установлена.

Особые предостережения и меры предосторожности

Препарат содержит лактозу и пшеничный крахмал. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в следовых количествах, и поэтому безопасен для людей с целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (отличается от целиакии) не стоит принимать этот препарат.

Дети

Инфлюцид нельзя применять детям младше 1 года, поскольку применение препарата недостаточно задокументировано в этой возрастной группе.

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом в случае:

- Если симптомы не улучшаются или ухудшаются,
- Если появляются дополнительные жалобы,
- Если температура тела удерживается или повышается свыше 39 °С.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Как и все лекарственные препараты, в период беременности или кормления грудью Инфлюцид следует принимать только после предварительной консультации врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке и на этикетке.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C. Не требует особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и содержимое

По 20 таблеток в блистере. По 3 блистера пакуются вместе с листком-вкладышем в картонную коробку.

Категория отпуска. Без рецепта.

Предприятие-производитель

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
Tel. +49 (721) 40 93 236

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Вильмар-Швабе Штрассе 4, 76227 Карлсруэ, Германия
Тел. 49 (0)721 4005 0, +49 (0)721 40005 165

Dr. Willmar Schwabe
GmbH & Co. KG
Germany, 76227 Karlsruhe,
Willmar-Schwabe-Str. 4
Tel.: 49 (0)721 4005 0, +49 (0)721 40005 165

Официальный представитель
Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцария