

БЕКИТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
Дары-дармектер жана медициналык
техникалар менен қамсыздандыруу
департаментинин башкы директору
Курманов Р.А. 
«13» июнь 2014 ж.

Дарыны медицинада колдонуу боюнча
НУСКАМА

(адистер учун маалымат)

ГАСТРИТОЛ

Каттоо номери _____

Соодадагы аталышы

Гастритол

Дарынын түрү.

Ичүү үчүн тамчылар

Дары каражатынын курамы:

100 мл дарынын курамында төмөнкүлөр камтылган:

Активдүү заттар каз таман чөбүнүн суюк ширеси (Anserinae herba) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 35 мл, топчу гүлүнүн суюк ширеси (Matricariae flos) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 45 % (об/об)) 20 мл, кызыл мыя тамырынын суюк ширеси (Liquiritiae radix) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 15 мл, кеме чайыр тамырынын суюк ширеси (Angelicae radix) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 5 мл, кардобенедикт чөбүнүн суюк ширеси (Cnici ben. herba) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 5 мл, ачуу эрмен чөбүнүн суюк ширеси (Absinthii herba) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 5 мл.

Башка кошулмалар (толуктагычтар) этанол 96 % (об./об.), тазартылган суу.

Сүрөттөмөсү

Тунук күрөн суюктук.

Фармадарылык тобу.

Тамак сицирүү жолунун функционалдуу бузулусуна колдонулуучу каражат.

АТС Коду A03A X.

Фармакологиялык касиети.

Дары ичеги-карын ооруларын козгоочу бир катар активдүү заттарды камтыйт, ашказандын кыймылдуу жана бөлүп чыгаруучу иштөөсүнө таасирин тийгизет *Potentilla anserinum* (каз таман) ичеги-карын жолунун булчундарынын чыңалуусуна таасирин тийгизет.

Licorice root (кызыл мыя тамыры) курамында глицирризин кислотасы камтылгандыктан, күчтүү сезгенүүгө каршы жана ткандардын грануляциясын жөнгө салуучу, чыйралууну басандатып, ичеги карын жолдорунун иштөөсүн жакшыртат (карышуучу таасир берет). Ашказандын былжыр челинин ваккуляризациясын жогорулатат. *Matricariae* (топчу гүл дарысы) сезгенүүгө каршы, аллергияга каршы, ткандардын калыбына келтируүчү натыйжасын берет. Хамазулен былжыр челине бат жана терең кирет. Гипофиз-адренал системасынын жандануусу кортикотропиндин жана кортизондун күчтөүлгөн түрдө бошонуусуна алыш келет. β -фарнезен жана α -бисаболол сезгенүүгө жана аллергияга каршы таасирге ээ. *Carduus benedictus* (кардобенедикт) курамында ачуу гликозид кницин бар, *Angelica root* (кеме чайыр) курамында бар ачуу заттарга эле окшош, ичеги карын мүчөлөрүнүн кан алмашуусун жакшыртат, жаранын айыгышын тездетет, жабыркаган ашказан былжыр челинин айыгуусун тездетет. Ачуу заттар *Absinthii herba* (ачуу эрмен) ашказан тонусун жогорулатат, ашказан ооруларынын белгилерин жакшыртат.

Көрсөтмө.

Функционалдык диспепсия, ич көбүү, ашказандын сезгенүүсү, өнөкөт гиперациддүү ашказан сезгенүүсүн, он эки эли жоон ичегинин, ашказан жара оорусун топтомдуу дарылоодо кодонулат.

Колдонуу жолу жана дозасы.

Башка дары каражатын колдонбосо күнүнө 3 жолу 20-30 тамчыдан, көп эмес өлчөмдөгү сууга аралаштырып тамак учурунда ичүү керек. Өтүшкөн жана оор абалында 15-25 тамчыдан ар бир жарым saat же бир saat сайын берилет. Кайталап дарыланууда дал ушундай ыкма колдонулат.

Дарылануунун узактыгы- 3-4 жума. Кайра дарыланууну 2 айдан кийин кайталаса болот.

Кыйыр таасирлери.

Өтө сейрек учурларда терисинин жогорку жарыкты сезгичтиги бар бейтаптарда байма бай күн нурунан келип чыккан күн нуруна күйгөн сымалдуу, тери реакциясы жүрүшү мүмкүн. Дарынын ар бир курамдык бөлүгүн көтөрө албашы адабий маалыматтарда аллергиялык кубулуштар сүрөттөлөт (теринин кызарышы, бүртүкчөлөрдүн жайылыши, кычышуу), ичеги-карын кубулуштары (жүрөк айлануу, кусуу), суу электролитинин тең салмагынын бузулушу.

Гастритол дарысын колдонгондо жогорудагы кыйыр реакциялар жүргөну байкалган эмес.

Каршы көрсөтмө.

Дарынын кайсы бир курамындагыларга жогорку сезгичтик, дарынын курамындагыларга аллергиялык реакциялар.

Ашыкча доза.

Кокус дозасынан ашырып алган учурда адамдын ден соолугуна коркунуч келтирбейт, ошондуктан атайын чараптар жүргүзүлбөйт.

Коопсуздук чаралары.

Гастритолдун курамына 40 об. % этанол камтылган.

Дарыны көрсөтүлгөн дозада ичүүдө ар бир өлчөмү менен кошо (25 тамчы) 0,4 г спирт ичилиет, бул боору ооруган, БНС сы жабыркаган, аракечтик менен ооругандарга, талмасы бар бейтаптарга, кош бойлууларга жана балдарга коркунуч туудурат. Башка дары каражаттарынын таасири басаңдан же күчөшү мүмкүн.

Өсүмдүктөрдөн жасалган суюк дары каражаттарында ак тартуу же тунаруу байкалат, бул тескери таасирлерди алыш келбейт жана дары каражатынын таасирдүүлүгүн төмөндөтпөйт.

Өзгөчө коопсуздук чаралары.

Дарынын 1 тамчысында 0,016 г этанол камтылган.

Кош бойлуулук жана эмчек эмизүү.

Бул учурда дарыны колдонууга жетиштүү тажрыйбанын жоктугунан, кош бойлуу же эмизүү учурунда колдонууга болбойт.

Авто унааны башкарууда жана өзгөчө жабдуулар менен иштөөдө таасир тийгизүүсү.

Дары каражатын туура көлөмдө колдонсо авто унааны башкарууда жана өзгөчө жабдуулар менен иштөөдө таасир тийгизбейт.

Балдар.

Жетиштүү тажрыйбанын жоктугунан 12 жашка чейинки балдарга дарыны колдонууга болбойт.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири.

Азыркы учурга чейин белгисиз.

Жарактуулук мөөнөтү.

3 жыл.

Таңгакчада көрсөтүлгөн жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Сактоо шарты жана жарактуулук мөөнөтү

Өзүнүн таңгакчасында 25°C дан жогору эмес аба табында сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Флаконду ачкандан кийинки сактоо мөөнөтү -3 ай.

Таңгакчада көрсөтүлгөн жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Чыгаруу категориясы.

Рецепти жок чыгарылат.

Чыгаруу формасы жана таңгакчасы.

Ичүү үчүн тамчылар.

Бир флакондо 20 мл, 50 мл, 100 мл камтылган, тамчылаткычы менен; катуу калың кагаз таңгакчада 1 флакон медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге салынган.

Өндүрүүчү.

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

БЕКИТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
Дары-дармектер жана медициналык
техникалар менен камсыздандыруу
департаментинин башкы директору
/Курманов Р.А. 
«13» Апрель 2014 ж.

Дарыны медицинада колдонуу боюнча

КОШМО-БАРАКЧА
(керектөөчүлөр үчүн маалымат)

ГАСТРИТОЛ
Ичүү үчүн тамчылар

*Бул дары каражатын колдонуунун алдында кошмо-баракчаны коңул коюп окуп чыгуунуз
керек!*

*Кошмо-баракчаны сактап коюнуз аны кайра окуп калышыңыз мүмкүн. Кошумча
маалымат же кеңешти өзүңүздүн дарыгериңизден же фармацевтиңизден алсаңыз болот.*

Эгерде зарыл деп эсептесеңиз аларга кеңешүүгө кайрылыңыз.

Дары каражатынын курамы:

100 мл дарынын курамында төмөнкүлөр камтылган;

Активдүү заттар; каз таман чөбүнүн суюк ширеси (Anserinae herba) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 35 мл , топчу гүлүнүн суюк ширеси (Matricariae flos) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 45 % (об/об)) 20 мл, кызыл мыя тамырынын суюк ширеси (Liquiritiae radix) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 15 мл, кеме чайыр тамырынын суюк ширеси (Angelicae radix) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 5 мл, кардобенедикт чөбүнүн суюк ширеси (Cnici ben. herba) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 5 мл, ачуу эрмен чөбүнүн суюк ширеси (Absinthii herba) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 5 мл.

Башка кошулмалар(толуктагычтар) этанол 96 % (об./об.), тазартылган суу.

Дарынын түрү.

Ичүү үчүн тамчылар.

Сүрөттөмөсү

Тунук, күрөң суюктук.

Фармадарылых тобу.

Тамак синирүү жолунун функционалдуу бузулусуна колдонулуучу каражат.

АТС Коду A03A X.

Көрсөтмө.

Функционалдык диспепсия, ич көбүү, ашказандын сезгенүүсү, өнөкөт гиперациддүү ашказан сезгенүүсүн, он эки эли жоон ичегинин, ашказан жара оорусун топтомдуу дарылоодо кодонулат.

Каршы көрсөтмө.

Дарынын кайсы бир курамындагыларга жогорку сезгичтик, дарынын курамындагыларга аллергиялык реакциялар.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири.

Азыркы учурга чейин белгисиз.

Коопсуздук чарапары.

Гастритолдун курамына 40 об. % этанол камтылган.

Дарыны көрсөтүлгөн дозада ичүүдө ар бир өлчөмү менен кошо (25 тамчы) 0,4 г спирт ичилиет, бул боору ооруган, БНС сы жабыркаган, аракечтик менен ооругандарга, талмасы бар бейтаптарга, кош бойлууларга жана балдарга коркунуч туудурат. Башка дары каражаттарынын таасири басаңдап же күчөшү мүмкүн.

Өсүмдүктөрдөн жасалган суюк дары каражаттарында ак тартуу же тунаруу байкалат, бул тескери таасирлерди алыш келбейт жана дары каражатынын таасирдүүлүгүн төмөндөтпөйт.

Өзгөчө коопсуздук чарапары.

Дарынын 1 тамчысында 0,016 г этанол камтылган.

Кош бойлуу жсана эмчек эмизүү.

Бул учурда дарыны колдонууга жетиштүү тажрыйбанын жоктугунан, кош бойлуу же эмизүү учурунда колдонууга болбойт.

Авто унааны башкарууда жана өзгөчө жабдуулар менен иштөөдө таасир тийгизүүсү.

Дары каражатын туура көлөмдө колдонсо авто унааны башкарууда жана өзгөчө жабдуулар менен иштөөдө таасир тийгизбейт.

Балдар.

Жетиштүү тажрыйбанын жоктугунан 12 жапка чейинки балдарга дарыны колдонууга болбойт.

Колдонуу жолу жана дозасы.

Башка дары каражатын колдонбосо күнүнө 3 жолу 20-30 тамчыдан, көп эмес өлчөмдөгү сууга аралаштырып тамак учурунда ичүү керек. Өтүшкөн жана оор абалында 15-25 тамчыдан ар бир жарым saat же бир saat сайын берилет. Кайталап дарыланууда дал ушундай ыкма колдонулат.

Дарылануунун узактыгы- 3-4 жума. Кайра дарыланууну 2 айдан кийин кайталаса болот.

Кыйыр таасирлери.

Өтө сейрек учурларда терисинин жогорку жарыкты сезгичтиги бар бейтаптарда байма бай күн нурунан келип чыккан күн нуруна күйгөн сымалдуу, тери реакциясы жүрүшү мүмкүн. Дарынын ар бир курамдык бөлүгүн көтөрө албашы адабий маалыматтарда аллергиялык кубулуштар сүрөттөлөт (теринин кызарышы, бүртүкчөлөрдүн жайылышы, кычышуу), ичеги-карын кубулуштары (жүрөк айлануу, кусуу), суу электролитинин төң салмагынын бузулушу.

Гастритол дарысын колдонгондо жогорудагы кыйыр реакциялар жүргөнү байкалган эмес.

Жарактуулук мөөнөтү.

3 жыл.

Сактоо

Өзүнүн таңгакчасында 25°C дан жогору эмес аба табында сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Флаконду ачкандан кийинки сактоо мөөнөтү -3 ай.

Таңгакчада көрсөтүлгөн жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Чыгаруу формасы жана таңгакчасы.

Бир флакондо 20 мл, 50 мл, 100 мл камтылган, тамчылаткычы менен; катуу калың кагаз таңгакчада 1 флакон медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге салынган.

Чыгаруу категориясы.

Рецепти жок.

Өндүрүүчү.

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. KG

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany