

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики

Курманов Р.А. _____
«30» _____ 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ТОНЗИЛОТРЕН TONSILOTREN®

Регистрационный номер _____

Торговое наименование
Тонзилотрен/Tonsilotren®

Международное непатентованное название
Нет

Лекарственная форма
Таблетки

Состав

В 1 таблетке (250 мг) содержится:

Активные вещества: Atropinum sulfuricum (атропина сульфат) D5 12,5 мг, Hepar sulfuris (гепар сульфур) D3 10,0 мг, Kalium bichromicum (калия бихромат) D4 50,0 мг, Mercurius bijodatus (ртути (II) йодид) D8 25,0 мг, Silicea (кремнезем) D2 5,0 мг;

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, сахароза, магния стеарат.

Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство

Показания к применению

Острый тонзиллит, хронический и хронически рецидивирующий тонзиллит, увеличение миндалин, ускорение заживления после хирургического удаления миндалин.

Противопоказания

Препарат не применять при известной гиперчувствительности к хрому, ртути или к одному из прочих ингредиентов;

- гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз);

- детский возраст до 6 лет.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особые предостережения и особые меры предосторожности

Препарат содержит лактозу и сахарозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат. Поскольку препарат содержит сахарозу, его не следует применять пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями как непереносимость фруктозы или недостаточность сахарозы-изомальтозы.

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом в случае:

- Если симптомы острого состояния не улучшаются или ухудшаются в течение 2 дней лечения;
- Если появляются дополнительные жалобы, например, температура тела выше 39 °С.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Принимать Тонзилотрен в период беременности или кормления грудью можно только после предварительной консультации с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Взрослые: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждый час, но не более 12 таблеток в день, до облегчения симптомов. Для *последующего лечения* или при *хронических состояниях*, принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Педиатрическая группа

Дети от 6 до 12 лет: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждые 2 часа, но не более 6 таблеток в день, до улучшения симптомов. При *последующем лечении* или при *хронических состояниях*, принимают по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети с 12 лет и старше: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждый час, но не более 12 таблеток в день, до облегчения симптомов. Для *последующего лечения* или при *хронических состояниях*, принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Взрослые и дети с увеличением миндалин принимают по 1 таблетке 3 раза в день. Рекомендуются продолжать лечение в течение 6-8 недель.

При хронических и хронически-рецидивирующих состояниях следует применять несколько циклов лечения в год продолжительностью 6-8 недель каждый.

Способ применения

Таблетки следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта.

Передозировка

Не установлены.

Побочные реакции

Очень редкие (<1/10,000) или неизвестные (частота не может быть оценена на основе имеющихся данных):

Реакции гиперчувствительности, например, сыпь на коже. В этих случаях, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При повышенном слюнообразовании следует снизить дозу препарата либо прекратить его прием.

Примечание: при применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска и упаковка

По 20 таблеток в блистере из ПВХ и алюминиевой фольги. По 3 блистера пакуются вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонную коробку.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие-производитель

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
Tel. +49 (721) 40 93 236

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Вильмар-Швабе Штрассе 4, 76227 Карлсруэ, Германия
Тел. 49 (0)721 4005 0, +49 (0)721 40005 165

Dr. Willmar Schwabe
GmbH & Co. KG
Germany, 76227 Karlsruhe,
Willmar-Schwabe-Str. 4
Tel.: 49 (0)721 4005 0, +49 (0)721 40005 165

Официальный представитель

Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцария