

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора  
Департамента лекарственных  
средств и медицинских изделий  
Министерства здравоохранения  
и социального развития  
Кыргызской Республики  
Мамбеталиева Ч.М.  
«17» сентября 2021г



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

### ЦИННАБСИН А (CINNABSIN® А)

#### Торговое название

ЦИННАБСИН А (CINNABSIN® А)

#### Лекарственная форма

Таблетки

#### Международное непатентованное название

Нет

#### Состав

1 таблетка (250 мг) содержит:

*действующие вещества:* Cinnabaris trit. D3 - 25 мг, Echinacea trit. D1 - 25 мг, Hydrastis trit. D3 - 25 мг, Kalium bichromicum trit. D3 - 25 мг;

*вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

#### Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления.

#### Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

#### Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия заметно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных веществ. Гомеопатические средства стимулируют защитные механизмы организма и тем самым активируют его способность к самовосстановлению. Реакция организма на гомеопатическое лекарство очень индивидуальна. По этим причинам дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

#### Показания к применению

Острый и хронический риносинусит.

#### Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из активных веществ или к одному из компонентов препарата, или членам семейства сложноцветных.

Противопоказан детям до 2 лет.

### **Особые указания и меры предостережения**

Если Ваш врач говорил Вам, что у Вас непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать Циннабсин А.

Препарат не рекомендуется применять при прогрессирующих системных заболеваниях (таких как туберкулез, саркоидоз), системных заболеваниях крови (например, лейкемии и лейкоз), аутоиммунных заболеваниях (например, при воспалительных заболеваниях коллагеновой ткани (коллагенозы), рассеянном склерозе), иммунодефиците (СПИД, ВИЧ-инфекции), при угнетенном состоянии (например, после трансплантации органа или костного мозга, химиотерапия).

После приема лекарств, содержащих эхинацею, наблюдались кожная сыпь, зуд и в редких случаях отек лица, одышка, головокружение и падение артериального давления.

Из-за содержания эхинацеи существует повышенный риск аллергических реакций у пациентов с атопией.

Использование лекарств, содержащих эхинацею, в единичных случаях связано с возникновением аутоиммунных заболеваний. При длительном применении (более 8 недель) лекарственного средства, содержащего эхинацею, в единичном случае наблюдалось уменьшение количества лейкоцитов.

Препарат содержит лактозу и пшеничный крахмал. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицита лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозы-галактозы не должны принимать этот лекарственный препарат. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в следовых количествах, и поэтому считается безопасным для людей с целиакией. Пациенты с аллергией на пшеницу (отличается от целиакии) не должны принимать этот лекарственный препарат.

Требуется консультация врача, если возникают следующие симптомы:

- отек лица, жар или сильная головная боль;
- острое состояние не улучшается или ухудшается в течение первых 2 дней лечения;
- возникают дополнительные жалобы.

### **Применение во время беременности и в период кормления грудью.**

Препарат следует принимать во время беременности и кормления грудью только с учетом оценки соотношения пользы и риска.

Пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием этого лекарственного средства.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.**

Не влияет.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Неизвестно. В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

*Примечание:* на действие гомеопатических лекарственных препаратов могут отрицательно влиять негативные факторы жизненных привычек такие как курение и употребление алкоголя.

### **Режим дозирования и способ применения**

Всегда следуйте указаниям данной инструкции или Вашего врача, или фармацевта. Если Вы не уверены в правильном применении препарата проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

### Режим дозирования:

Взрослые: *при острых состояниях* принимают по 1 таблетке каждый час (максимум до 12 таблеток в день) до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

### Дети

Дети в возрасте от 2 до 5 лет: *при острых состояниях* принимают по 1 таблетке 3 раза в день до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети в возрасте от 6 до 11 лет: *при острых состояниях* принимают по 1 таблетке каждые два часа (максимум до 6 таблеток в день) до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети в возрасте 12 лет и старше: *при острых состояниях* принимают по 1 таблетке в час (максимум до 12 таблеток в день) до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

При *хронических состояниях* детям и взрослым принимать по 1 таблетке 3 раза в день. Рекомендуется продолжать лечение от 4 до 6 недель.

Циннабсин А не рекомендуется принимать свыше 4 недель, не проконсультировавшись с врачом.

### Способ применения

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. Маленьким детям рекомендуется растворить таблетку в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

### **Побочные реакции**

Очень редко (<1/10000) или с неизвестной частотой (частота не может быть оценена из имеющихся данных):

После приема Циннабсин А могут возникнуть реакции гиперчувствительности, например, кожные высыпания и желудочно-кишечные расстройства. В этих случаях прием препарата следует прекратить и принять соответствующие меры лечения.

Если появляется повышенное слюноотделение, дозировка должна быть уменьшена или лечение прекращено.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

*Примечание:* существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических лекарств (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием лекарств и проконсультироваться с врачом.

### **Передозировка**

Не установлена.

### **Упаковка**

20 таблеток в блистере. 3 блистера с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.,  
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,  
Германия

**Владелец регистрационного удостоверения**

Альпен Фарма ГмбХ  
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,  
Германия