

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственных
средств и медицинских изделий
Министерства здравоохранения
и социального развития
Кыргызской Республики
Мамбеталиева Ч.М.
«14» октября 2021г



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИНФЛЮЦИД А (INFLUCID® A)

Торговое название

ИНФЛЮЦИД А (INFLUCID® A)

Лекарственная форма

Таблетки

Международное непатентованное название

Нет

Состав

1 таблетка (250 мг) содержит:

действующие вещества: Aconitum trit. D3 25 мг, Gelsemium trit. D3 25 мг, Ipecacuanha trit. D3 25 мг, Phosphorus trit. D5 25 мг, Bryonia trit. D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum trit. D1 25 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал пшеничный, магния стеарат.

Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия заметно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных веществ. Гомеопатические средства стимулируют защитные механизмы организма и тем самым активируют его способность к самовосстановлению. Реакция организма на гомеопатическое лекарство очень индивидуальна. По этим причинам дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

Показания к применению

Лечение и профилактика лихорадочных гриппоподобных инфекций и других острых вирусных инфекций верхних дыхательных путей. Поддерживающее лечение гриппа.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к Посконнику пронзенолистному (посконник обыкновенный) или другим представителям семейства астровых/сложноцветных, к любым другим действующим веществам или к любому другому компоненту препарата.

Противопоказан детям до 1 года.

Особые указания и меры предостережения

Если Ваш врач говорил Вам, что у Вас непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать препарат.

Лекарственное средство содержит лактозу и пшеничный крахмал. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не должны принимать это лекарственное средство. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в следовых количествах, и поэтому считается безопасным для людей с целиакией. Пациенты с аллергией на пшеницу (отличной от целиакии) не должны принимать препарат.

Требуется консультация врача, если возникают следующие симптомы:

- если состояние не улучшается или ухудшается,
- если возникают дополнительные жалобы,
- если температура сохраняется или поднимается выше 39°C.

Применение во время беременности и в период кормления грудью.

Препарат следует принимать во время беременности и кормления грудью только с учетом оценки соотношения пользы и риска.

Пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием этого лекарственного средства.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.

Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействий с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Применение этого гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом, если они принимают, недавно принимали или могут принимать любые другие лекарственные средства.

Примечание: на действие гомеопатических лекарственных препаратов могут отрицательно влиять негативные факторы жизненных привычек такие как курение и употребление алкоголя.

Режим дозирования и способ применения

Всегда следуйте указаниям данной инструкции или Вашего врача, или фармацевта. Если Вы не уверены в правильном применении препарата проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

Режим дозирования:

Взрослые: при *острых состояниях*: принимают по 1 таблетке с интервалами в один час, максимум до 12 таблеток в день, пока не наступит улучшение. Для *последующего лечения*, принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Для профилактики инфекций, принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Дети

Дети в возрасте от 1 до 11 лет: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждые 2 часа, максимум до 8 таблеток в день, пока не наступит улучшение. Для *последующего лечения*, принимают по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети в возрасте 12 лет и старше: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке с интервалами в один час, максимум до 12 таблеток в день, пока не наступит улучшение. Для *последующего лечения*, принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Для *профилактики* инфекций дети в возрасте от 1 до 11 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в день, а дети в возрасте 12 лет и старше – по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Способ применения

Таблетки должны медленно растворяться во рту. Для маленьких детей таблетки можно растворить в небольшом количестве воды.

Следует соблюдать интервал не менее получаса до или через полчаса после приема еды.

Побочные реакции

Очень редко (<1/10,000) или с неизвестной частотой (не может быть оценено, исходя из имеющихся данных):

Реакции гиперчувствительности, например, кожные высыпания и желудочно-кишечные расстройства.

В этих случаях следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Примечание: существующие жалобы могут временно ухудшаться при приеме гомеопатических лекарств (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Не установлена.

Упаковка

20 таблеток в блистере. По 2 блистера с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.,
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия