

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора  
Департамента лекарственных  
средств и медицинских изделий при  
Министерстве здравоохранения  
Кыргызской Республики

Абдиев М.К.

« 02 » Июль 2023 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПРОСПАН®  
PROSPAN®

**Торговое название:** Проспан®

**Международное непатентованное название:** нет

**Лекарственная форма:** раствор для приема внутрь.

### Состав

5 мл раствора (1 пакетик) содержат:

*Действующее вещество:* сухой экстракт листьев плюща

35 мг сухого экстракта плюща [(5-7,5): 1], экстрагент: этанол 30 об. %.

*Вспомогательные вещества:* калия сорбат, кислота лимонная безводная, сорбита раствор 70 % (кристаллизирующийся), ксантановая камедь, ароматизатор Frescofort Permaseal, ароматизатор апельсиновый натуральный, ментол, вода очищенная.

### Описание

Светло-коричневый, мутноватый раствор с фруктовым запахом и ментоловым вкусом.

### Фармакотерапевтическая группа

Препараты для устранения симптомов простуды и кашля. Отхаркивающие препараты  
Отхаркивающее средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** R05CA

### Фармакологическое действие

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и спазмолитическое действие.

Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

### Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких, сопровождающихся кашлем с трудноудаляемой мокротой.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Применение во время беременности и кормления грудью

Поскольку данные о безопасности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, препарат не следует применять в это время.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям старше 12 лет принимать раствор по 1 пакету (5 мл) 3 раза в день, что соответствует 105 мг сухого экстракта листьев плюща, детям в возрасте 6-11 лет - по 1 пакету (5 мл) 2 раза в день, что соответствует 70 мг сухого экстракта листьев плюща.

Перед применением пакетик следует слегка размять. Раствор принимать неразбавленным утром (в обед) и вечером.

Длительность лечения зависит от характера и тяжести симптомов заболевания и составляет, как правило, одну неделю.

При отсутствии улучшения состояния на протяжении более 1 недели необходимо обратиться к врачу.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства такие как тошнота, рвота и диарея.

### **Передозировка**

Прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею.

Лечение передозировки - симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Исследования относительно взаимодействия не проводились. До настоящего времени взаимодействия не известны.

### **Особые указания**

Препарат не стоит применять детям в возрасте до 6 лет. Препарат содержит сорбит. Если его применять согласно инструкции, пациент будет получать до 1,9 г сорбита при каждом приеме.

Пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы не следует применять Проспан раствор от кашля.

### **Форма выпуска**

По 5 мл раствора для внутреннего применения в пакетике; по 21 пакету вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25° С в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска для аптек**

Без рецепта.

### **Производитель**

Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ & Ко КГ.,  
Херцбергштрассе, 3, Д-61138 Нидердорфельден, Германия

### **Официальный представитель**

Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцария